

## ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРИОНА ПРИ АСТЕНИИ У МУЖЧИН С СЕКСУАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ (Морозов П.В. )<sup>1</sup>

Лечение сексуальной астении требует разностороннего подхода и может быть выявлено у разных пациентов. В Табл.1 представлены основные результаты по влиянию Энериона на либидо.

**Таблица 1.** оценка эффективности сульбутиамина у разных групп пациентов.

Профиль пациента	Режим дозирования/ длительность	Результат
Пациенты с сексуальными расстройствами астенического характера (50 человек)	2 таб. В день в течении 1 мес.	<b>100%</b> уменьшение симптомов астении; <b>90%</b> пациентов усиливал эрекцию; <b>85%</b> усиливал половое влечение; <b>77%</b> отметили повышение самооценки
Пациенты с астеническим синдромом и ДГПЖ (43 пациента)	По 1 таб 2 раза в день за 8 дней до операции и 20 дней после	Большинство пациентов отметили <u>высокую терапевтическую активность</u> (улучшение памяти/внимания/беспокойства).  Действие Энериона на вегетативную систему, что приводит к <u>нормализации сна, уменьшение тревожности</u> особенно важно до и после операции.

1. П.В. Морозов «Новое в лечении астении» ([https://con-med.ru/magazines/psikhiatriya\\_i\\_psikhofarmakoterapiya\\_im\\_p\\_b\\_ganushkina/psikhiatriya\\_i\\_psikhofarmakoterapiya\\_im\\_p\\_b\\_ganushkina-03-2005/novoe\\_v\\_lechenii\\_astenii/](https://con-med.ru/magazines/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina-03-2005/novoe_v_lechenii_astenii/))